

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux Agriculteurs du Lauragais, du Razès et de la Piège, rédigé en
collaboration avec les G.D.A., les Coopératives et la ferme de Loudes

N° 12 C du 16 MAI 1991

GRANDES CULTURES N° 4

BLE	Traitement du stade 10-3 (moitié épiaison) au stade 10-5 (tous les épis sortis)
ORGE	Traitement épiaison
POIS	Renouvellement de la protection dans les situations tardives
COLZA	R.A.S.
TOURNESOL	R.A.S.
MAIS	R.A.S.

BLE

L'état sanitaire général est très bon mis à part la présence de mosaïques, affections virales présentes sur l'ensemble du secteur; le comportement variétal est important; il n'existe pas de moyens de lutte chimique, seule l'utilisation de variétés tolérantes ou résistantes peut permettre de contourner ce problème.

SEPTORIA TRITICI

Cette maladie est en régression

SEPTORIA NODURUM

Cette maladie est absente de toutes les situations audoises plus ou moins soumises à l'influence méditerranéenne.

Dans les régions à dominante atlantique ou plus continentale (Hte-Garonne, Tarn) la Septoriose est présente et nécessite dans ce cas une intervention à l'aide d'une matière active efficace sur ce champignon.
(Consultez votre technicien de secteur)

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67 92 41 42



OIDIUM

Présent dans de nombreuses cultures, quelques fois jusque sur la F3. Sa seule présence ne doit pas justifier un traitement spécifique.

MAILLÉE MINORE

Présente dans quelques situations, mais il faut la chercher. Cette situation était prévisible, compte-tenu de l'absence totale de la maladie en fin d'hiver (notre bulletin N° 2 du 14/03/91)

Le seuil retenu pour intervenir est : présence généralisée de la RB sur la F 4

Le but poursuivi est de préserver les 3 derniers étages foliaires, ainsi que les barbes sur blé dur

Compte-tenu de l'état sanitaire nous vous recommandons d'attendre la pleine épisaison (stade 10-5) pour traiter

stade 10-5 : tous les épis hors de la gaine

Sur parcelles présentant de la RB d'une manière significative sur F4 traitez au stade 10-3 (moitié de l'épisaison)

Cette intervention permettra en outre, appliquée dès le début de ce stade, de protéger les épis contre une éventuelle attaque de **FUSARIOSE**

Pour des situations particulières, ou en cas de doute, **vous pouvez toujours nous consulter** (techniciens de GDA, de coopératives, protection des végétaux)

* * * * *

*** A l'épisaison *** appliquez une des solutions suivantes :

* * * * *

HORIZON	1	1/ha
LIBERO	1,5	1
ALTO AMBEL	0,5	1
ALTO	0,8	1
PLANETE R	1,5	1
SPOT	1,5	1

Si forte pression d' **OIDIUM** rajoutez :

CORBEL	0,5	1
BOSCOR	0,5	1

PUCERONS DES EPIS

On peut observer actuellement la présence de colonies de pucerons (Sitobions essentiellement)

Le seuil à l'épisaison est de 1 épi sur 2 colonisé par au moins 1 puceron

Rajoutez au fongicide un des insecticides suivants :

PIRIMOR G	0,250	kg/ha
KARATE	0,125	1
DECIS CE	0,125	1
TALSTAR	0,050	1
BAYTHROID	0,300	1




TRAITEZ

stade 10-3 : moitié des épis sortis

* * * * *

stade 10-1 : premiers épis sortis; barbes apparaissant



TROP
TOT